© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

oft nur $3^1/_2$ Umgänge), die letzte Windung constant scalarid anlegt und trotz des an die Malteser Clausilien erinnernden Habitus doch keinen näheren Vergleich mit denselben aushält, sich vielmehr in Bezug auf die Bildung des Verschlusses in gewissem Sinne an die Lerosiensis-Gruppe von Albinaria anlehnt.

Diagnosen neuer Arten.

Von

W. Kobelt.

Helix (*Xerophila*) *piratarum* n. sp.

Testa mediocriter, sed haud pervie umbilicata, depresse globuloideo-conica, solida, cretacea, irregulariter striatula, alba, plerumque fusco varie zonata et superne strigata, spira depresse conoidea, summo minuto, laevi, nigro. Anfractus 6, superi vix convexi, sutura lineari discreti, regulariter crescentes, ultimus dilatatus, subinflatus, antice leviter descendens et deflexus. Apertura obliqua, transverse ovalis, distincte lunata, peristomate simplici, intus labio crasso porcellaneo munito, marginibus conniventibus, haud junctis, basali super umbilicum vix reflexiusculo.

Diam. maj. 24,5, min. 20,5, alt 18 mm.

Zunächst mit cretica Fér. und euphorca Bgt. verwandt, aber erheblich mehr in die Quere verbreitert.

Helix (Xerophila) Jickelii Nevill mss.

Testa perforata, depresse globuloidea, tenuicula, irregulariter striata, striis prope suturam costiformibus; albida, zonulis fuscis varie ornata; spira depressa; sutura linearis, impressa. Anfractus 6 convexiusculi, regulariter crescentes, ultimus subinflatus, oblique dilatatus, sub-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

depressus, antice descendens. Apertura rotundato-ovata, lunata, obliqua, peristomate recto, acuto, intus albolabiato, marginibus conniventibus, supero leviter protracto, basali vix super perforationem reflexiusculo.

Diam. maj. 16, min. 13, alt. 10,5 mm.

Hab. Abyssinia.

Mir von Herrn Nevill zur Veröffentlichung mitgetheilt, zur Gruppe der variabilis gehörig, die somit bis nach den oberen Nilländern vordringt.

Helix (*Jacosta*) *Moraguesi* n. sp.

Testa late et perspectiviter umbilicata, depressa, spira plana, carina irregulari munita, solidula, cretacea, albida vel obsoletissime fasciata; apex minimus, laevis; sutura impressa, crenulata. Anfractus $5^1/_2$ plani, leniter regulariterque crescentes, carinati, costis obliquis distantibus, ad carinam distinctioribus sculpti, ultimus quam penultimus vix latior, descendens, carina irregulariter flexuosa serrata cingulatus, supra planatus vel impressus, infra rotundatus, circa umbilicum indistincte cristatus costis in umbilicum decurrentibus. Apertura irregularis, lunata, ad carinam canaliculata, peristomate recto, albolabiato, marginibus conniventibus, callo tenuissimo junctis, supero protracto, basali regulariter arcuato, vix reflexo.

Diam. maj. 12, min. 10, alt. 4,2 mm.

Hab. Palma insulae Mallorka; leg. cl. Moragues.

Meiner Sigensis ähnlich und zu derselben in gleichem Verhältniss stehend, wie explanata zu depressula, doch jederzeit durch einen halben Umgang mehr bei geringerer Grösse, und weitläufigere Berippung zu unterscheiden.

Helix (Helicella) Heynemanni n. sp.

Testa late umbilicata, umbilico ultra anfractum penultimum coarctato, depressiuscula, solidula, cretacea, alba,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

plerumque fasciis castaneis ornata, striatula; spira depresse convexa, apice minuto, nigro; sutura lineari. Anfractus 6 convexiusculi, dense regulariterque costulato-striati, regulariter accrescentes, ultimus vix dilatatus, subteres, antice lente descendens, haud deflexus. Apertura ovato-rotundata, parum lunata, peristomate tenui, acuto, intus distincte labiato, marginibus conniventibus, basali ad insertionem vix dilatato.

Diam. maj. 12, min. 10, alt. 7 mm.

Hab. Tetuan.

Meiner andalusica von Algesiras nahestehend, aber kreidiger, der letzte Umgang vorn nicht herabgebogen und weniger verbreitert.

Helix (Candidula) ordunensis n. sp.

Testa parva anguste sed pervie umbilicata, depresse globosa, striatula, solidula albida, zonis castaneis angustis 2 distinctis, supera quoque in anfractibus spirae, lineaque basali pallida ornata; spira convexa, apice minuto, nigro, laevi; sutura linearis. Anfractus 5 convexiusculi, regulariter crescentes, dense regulariterque striati, ultimus subinflatus, antice vix descendens. Apertura parum obliqua, lunato-circularis, labro simplici, acuto, intus distincte albolabiato, marginibus conniventibus, basali ad insertionem vix dilatato.

Diam. maj. 7,5, min. 7, alt. 5,5 mm.

Hab. prope Orduña Biscayae.

Trotz der geringen Dimensionen offenbar ausgewachsen, von allen Verwandten durch die kugelige Form leicht zu unterscheiden.